

HERNIA INGUINAL POR LAPAROSCOPIA. COMPLICACIONES.

Miguel Angel Carbajo Caballero
H. Campo Grande (Valladolid)

HERNIOPLASTIA T.A.P.

- 1993-1995.
- 38 pacientes.
- 43 hernias.

T.A.P COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS.

■ Hemorragia por trocar	1(2.2%)
■ Hemorragia epigástrica	2(4.5%)
■ Flap peritoneal insuficiente	8(18%)
■ Reconversión	0

T.A.P. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS INMEDIATAS

■ Edema de pared	0
■ Hematoma	2(4.5%)
■ Neuralgia	1(2.2%)
■ Infección	0
■ Seroma	0
■ Dolor (Analgesia+48h.)	0
■ Retención urinaria	2(4.5%)
■ Complicaciones generales	0

T.A.P.COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS TARDIAS.

■ Recidiva	2(4.5%)
------------	---------

■ Retirada de malla	0
---------------------	---

■ TRATAMIENTO RECIDIVAS: TEEP

HERNIOPLASTIA T.E.P.P.

- 1995-1997
- 56 pacientes
- 70 hernias

T.E.P.P. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS.

■ Hemorragia trocar	1(1.4%)
■ Hemorragia epigástrica	1(1.4%)
■ Hemorragia V.Iliaca	1(1.4%)
■ Rotura peritoneo	5(7.1%)
■ Reconversión	1(1.4%)

T.E.P.P. COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS INMEDIATAS


■ Hematoma	1(1.4%)
■ Neuralgia	2(2.8%)
■ Edema pared	0
■ Seroma	4(5.7%)
■ Infección	0
■ Complicaciones generales	0
■ Retención urinaria	1(1.4%)
■ Dolor (Analgesia+48h)	0

T.E.P.P. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TARDIAS.

- Recidiva

- Retirada de malla

- TRATAMIENTO RECIDIVAS: TAPP-PTFE



Hernioplastias TAPP-PTFE

- **1997-2001.**
- **108 Pacientes.**
- **122 Hernias.**

TAPP-PTFE

COMPLICACIONES

INTRAOPERATORIAS

■ **NINGUNA**

■ **Reconversión**

0

TAPP-PTFE COMP. POSTOPERATORIAS INMEDIATAS


■ Neuralgia	2(1.6%)
■ Hematoma	1(0.8%)
■ Edema pared	0
■ Seroma	0
■ Infección	0
■ Complicaciones generales	0
■ Retención urinaria	1(0.8%)
■ Dolor (Analgesia+48h)	3(2.4%)

TAPP-PTFE COMP. POSTOPERATORIAS TARDIAS

■ **Recidiva** **3(2.4%)**

■ **Retirada malla** **0**

■ **TRATAMIENTO RECIDIVAS: TAPP-PTFE**



SLIDE

0:02:51